

PRÍBALOVÁ INFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

NÁZEV:

CANNEFF VAG SUP - VAGINÁLNÍ ČÍPKY

VÝROBCE:

CB21 Pharma, s.r.o.

Studentská 812/6, Bohunice

625 00 Brno

Složení:

CANNEFF VAG SUP jsou vaginální čípky torpédovitého tvaru obsahující:

Sodná sůl kyseliny hyaluronové, cannabidiol, glycerol monostearát, tuhý tuk, voda čištěná.

Způsob balení:

CANNEFF VAG SUP je dodáván ve formě individuálně balených čípků v kavitách spojených na platě po 3, 5 nebo 10 kusech. Balení obsahuje vždy jedno plato s 3, 5 nebo 10 kusy čípků po 2 g.

Popis a důvody pro použití:

Vaginální čípky CANNEFF VAG SUP působí díky kyselině hyaluronové, která je v čípcích přítomna ve formě své soli - hyaluronanu sodném. Jako mukopolysacharid je hojně distribuována v mnoha tělesných tkáních, v nichž slouží jako strukturální podpora přinášející tkáním napětí, výživu a pružnost.

Indikace:

CANNEFF VAG SUP vaginální čípky se používají jako pomocná léčba při procesech hojení stavů atrofické a dystrofické poševní sliznice. Napomáhají hojení po porodu a gynekologické chirurgii, v případech dystrofie po chemoterapii, ionizujícím záření, vaginální suchosti i z důvodu nedostatku estrogenu.

Přináší úlevu od příznaků vaginálního diskomfortu, po přeléčeném vaginálním zánetu či vaginální mykóze.

Důvody pro nepoužívání:

- Důvodem pro nepoužívání čípků je individuální přecitlivělost na některou ze složek přípravku.
- Není vhodný pro děti do 12 let a mladistvé.
- Těhotenství a kojení: Bezpečnost použití čípků CANNEFF VAG SUP v průběhu těhotenství a kojení nebyla prokázána. Vzhledem k možné akumulaci cannabidiolu v mateřském mléku kojících matek, není pro ně tento přípravek doporučen.
- Vliv na schopnost řídit a obsluhovat zařízení nebo stroje: Žádná zvláštní opatření nejsou nutná, CBD nemá psychotropní účinky. Přesto doporučujeme poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Interakce s jinými produkty:

Interakce s jinými produkty nejsou známy, proto je vhodné před použitím vaginálních čípků současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léčivými kontakty ošetřujícího lékaře.

Návod k použití:

V místě perforace oddělte z plata 1 čípek, obal mírným tahem roztrhněte a čípek z něj vyjměte. Zaobleným koncem napřed jej zaveďte hluboko do pochvy.



Z hygienického hlediska je doporučeno si umýt ruce před a po aplikaci zdravotnického prostředku.

Dávkování a doba užívání:

Použijte jeden čípek denně nejlépe večer nebo podle lékařského doporučení. Délka

používání závisí na vývoji onemocnění a neměla by přesáhnout 30 dní.

Nežádoucí účinky:

Dlouhodobé používání všech místně aplikovaných produktů může vést k projevům přecitlivělosti. V těchto případech léčbu přerušte a poraďte se se svým lékařem za účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se vyskytnou jiné nežádoucí účinky, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti nebo pokud je vnitřní primární obal otevřen nebo poškozen.

Způsob uchování a doba použitelnosti:

Uchovávejte v původním obalu v rozmezí teplot od 2 °C do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Doba použitelnosti 2 roky.

Verze a datum poslední revize:

PI/VAG-SUP/01_2021

27.01.2021

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

CE
2265

Vysvětlivky k použitým značkám pro správné použití přípravku



Čtěte návod k použití



Omezení teploty – označuje meze teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven



Chrání před slunečním zářením



Výrobce



Použit do data – označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek nemá používat



Kód dávky – označuje kód dávky výrobce pro možnost identifikace dávky nebo šarže



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno